

LES ROSES.

Nomenclature des variétés connues de cette espèce.

R. BREVISTYLA.

R. *Germinibus ovatis glabris; pedicellis hispidulis aliquando glabris; laciniis calycinis pinnatifidis; stylis in columnam glabram brevem coalitis.* (N.)
 R. *Brevistyla*. D.C. Fl. franç. vol. 6, p. 537.
 R. *Leucochroa*. Desv. Journ. Bot. 2, p. 316, *ibid.* 1813, p. 113. Lois. not. p. 80.
 D.C. cat. monsp. p. 138, n° 6.

Les Rosiers suivants composent la quatrième division de la série des Rosiers à styles soudés (voyez page 90).

α. R. *Brevistyla leucochroa*.

R. *Brevistyla petalis albis basi flavidis*. D.C. Fl. franç. vol. 6, p. 537, v. α.

R. (*Leucochroa*) Desv. l. c. Tab. 15. D.C. cat. monsp. 138.

R. *Germinibus ovatis pedunculisque glabris, calycinis laciniis pinnatifidis, foliis ovatis glabris lucidis, stylis subsessilibus connato-capitatis, glabris*. Lois. not. p. 80.

β. R. *Brevistyla lactea*.

R. (*Leucochroa*) *lactea fl. candidis*. Lois. l. c.

R. *Brevistyla petalis lacteis*. D.C. Fl. franç. l. c. v. β.

Cette variété ressemble à la première, mais ses fleurs sont parfaitement blanches.

γ. R. *Brevistyla systyla*.

R. (*Systyla*) *calycum tubis ovatis glabris; pedunculis hispidulis; petiolis nervisque pubescentibus; foliis ovato-lanceolatis glabris; floribus solitariis; stylis in columnam cylindricam coalitis*. Bast. supp. à la Fl. de Maine-et-Loire, p. 31.

R. *Brevistyla petalis pallide roseis*. D.C. Fl. franç. l. c. v. γ.

R. (*Leucochroa*) *angusta*. Desv. Journ. 1813, l. c. v. β.

Ces Rosiers croissent dans le Haut-Poitou, dans l'Anjou, et il est vraisemblable qu'on les trouvera encore ailleurs quand on prendra la peine de les chercher. La variété γ est plus rare que les autres. Toutes trois nous ont été envoyées de La Flèche, par M. L^r MEUNIER, et nous les cultivons avec succès.